

I Melaninici Classici

I CANARINI AGATA

Sono classificati in:

Agata Giallo - Agata Giallo Avorio - Agata Rosso - Agata Rosso Avorio - Agata Bianco Dominante - Agata Bianco Recessivo

CARATTERI TIPICI

Il tipo Agata (Nero ridotto), sul quale ha agito il **1° fattore di riduzione**, è caratterizzato dalla riduzione quantitativa della eumelanina nera e dalla forte riduzione della feomelanina.

Per effetto di tali riduzioni l'Agata presenta:

- concentrazione del nero al centro delle penne e piume con massima riduzione della feomelanina;
- ampia bordatura grigio perla (mandorle) alle remiganti e timoniere, fondo (interstrie) molto chiaro e luminoso, segni questi di evidente riduzione feomelaninica;
- mustacchi ben evidenti, caratterizzati da pigmento nero;
- striature sulla testa, sul dorso e sui fianchi sottili, interrotte e simmetriche;
- scomparsa del pigmento melaninico nella zona sopraciliare, indice del grado di riduzione della feomelanina;
- becco, zampe ed unghie comprese, di colore carnicino.

I Melaninici Classici

Punti a disposizione 30

Valutazioni	Descrizioni	Punti
OTTIMO	Massima riduzione della feomelanina, forte concentrazione del nero nelle striature, vergature e marcature con ampia bordatura di colore grigio perla alle timoniere e remiganti, fondo(interstrie) molto chiaro e luminoso . Striature della testa, del dorso e dei fianchi sottili ed interrotte - mustacchi netti e ben segnati; abbondante zona sopraccigliare priva di melanina (specialmente negli intensi). Becco, zampe ed unghie comprese carnicini.	29-28
BUONO	Striature sulla testa, dorso e sui fianchi simmetriche di buona tonalità di nero, buona riduzione feomelanina - bordature grigio perla evidenti. Mustacchi ben definiti - zona sopraccigliare priva di melanina. Becco, zampe unghie comprese carnicini. Rientrano in questa classificazione anche i soggetti ottimi come disegno e diluizione della feomelanina e che presentano tracce di melanina alle unghie. Le zampe devono comunque essere carnicine.	27-26
SUFFICIENTE	Striature della testa, dorso ed ai fianchi eccessivamente lunghe e/o larghe - mancanza di striature ai fianchi, mustacchi poco pronunciati - zona sopraccigliare interessata da melanina. Manifesta presenza di feomelanina. Becco ed unghie con moderata presenza di melanina.	25-24
INSUFFICIENTE	Scarsa riduzione della feomelanina - striature lunghe e continue, scarsamente segnate, o asimmetriche - mustacchi scarsi - zona sopraccigliare poco evidente a causa di abbondante melanina. Becco zampe ed unghie con evidenti tracce di melanina. Soggetti tendenti al tipo Nero.	23-18